

Por precaución, **NO DEBERÍAN hacer la Prueba/Test de la Hidrargiria Provocada o Challenge Test con DMPS intravenoso** (esto también, aunque en menor medida, podría ser aplicable a pruebas de provocación con otros quelantes, tales como DMSA, EDTA o DMPS oral):

- Las **personas con intoxicación aguda por mercurio u otros metales pesados**.
- Las **personas alérgicas** y, sobre todo, muy alérgicas **al mercurio u otros metales pesados** (no obstante, con unas medidas muy especiales, que incluye la Vitamina C intravenosa a grandes y controladas dosis, hay profesionales sanitarios que hacen esa prueba de provocación sin observarse efecto secundario alguno en el paciente).
- **Embarazadas** (quienes tampoco, en principio, deberían extraer las amalgamas).
- Personas con **insuficiencia renal grave**.
- Personas con **disfunción de la glándula paratiroides**.
- Personas con **trastornos hepáticos severos**.
- Dicho coloquialmente, por precaución, también deberían evitar realizar esa prueba, las **personas muy enfermas** (con cansancio extremo, problemas digestivos o inmunitarios importantes, etc.).

NOTA: De no seguir estas precauciones, se corre el riesgo de redistribución del mercurio/otros tóxicos. Siguiéndolas, yo (*Servando Pérez Domínguez*) no conozco ningún caso de empeoramiento a corto, medio o largo plazo. [Varios socios de *MERCURIADOS*, y yo mismo, realizamos la **Prueba/Test de la Hidrargiria Provocada** con DMPS intravenoso—yo el 1.7.08—, sin experimentar ningún tipo de problema]. Realizar dicha prueba nos sirvió para demostrar médico-legalmente nuestra intoxicación mercurial crónica, aún cuando pruebas clásicas de determinación de mercurio y/u otros metales pesados (principalmente en sangre y orina y, en algún caso, también en pelo) arrojaban niveles de “normalidad”, esto es, falsos negativos. En todo caso, cada persona DEBE valorar, tranquila y sopesadamente, el realizar o no dicha prueba.